



Рис 7. Схема почвенного районирования по Е П Рудневой, 1961

Почвенные районы I — Нижне Неманский аллювиально-луговых и болотных (преимущественно лугово-болотных и перегнойно торфяных) почв на древнеаллювиальных отложениях, II — Шяшупе Неманский дерново сильноподзолистых и торфяно перегнойно подзолистых илювиально-гумусовых песчаных почв на древнеаллювиальных и флювиогляциальных песках, III — Самбийский район а — дерново среднеподзолистых суглинных и поверхностноподзолистых илювиально-гумусово-железистых супесчаных и песчаных почв на морене, б — дерново остаточноподзолистых, большей частью поверхностнооглеенных почв на перемытых двучленных ледниковых отложениях, IV — Приморский поверхностноподзолистых илювиально-гумусово железистых и торфяно-перегнойно-подзолистых илювиально-гумусовых почв на древнеаллювиальных и современных морских песках, V — Прегольский дерново-сильноподзолистых и торфяно-перегнойно-подзолистых илювиально-гумусовых и болотных почв на древнеаллювиальных и морских песках, VI — Центральный Дейма Прегольский дерново остаточноподзолистых и дерново глеевых средние и легкосуглинных почв на перемытых «двучленных» ледниковых отложениях VII — Инстручский дерново слабо и скрытоподзолистых дерново остаточноподзолистых поверхностнооглеенных и дерново глеевых почв на тяжело- и среднесуглинных древнеозерных и водно-ледниковых отложениях, VIII — Мамоновский дерново, слабо и скрытоподзолистых валуных супесчаных и песчаных почв и дерново остаточноподзолистых поверхностно оглеенных почв на перемытых «двучленных» ледниковых отложениях, IX — Нижне Прохладненский дерново глеевых тяжело-суглинных почв на глинистой и тяжело-суглинной морене, X — Багратионовский а — дерново, скрыто- и слабоподзолистых супесчаных и песчаных почв на валуных песках и суглинках, б — дерново остаточно-слабоподзолистых хрящеватосуглинных почв на тяжело-суглинной морене, XI — Лава-Иправдинский дерново- и скрытоподзолистых тяжело-суглинных почв на водно-ледниковых безвалуных отложениях и лептчных глинах, XII — Анграла-Писсавский дерново остаточноподзолистых поверхностнооглеенных и дерново глеевых валуно суглинных почв на перемытых, чаще «двучленных» ледниковых отложениях, XIII — Вишгитский дерново-, слабо- и среднеподзолистых почв на супесчаной и песчаной морене и «двучленных» ледниковых отложениях